

狂犬病足以讓人致命



世界衛生組織公布，全球平均約10分鐘就有1人因狂犬病死亡，95%發生於亞洲及非洲。感染狂犬病未及時治療，**致死率幾乎是100%！**


(圖片來源：美國CDC網站)

預防狂犬病，民衆注意事項：

一、動物「抓咬傷前」預防

- 前往狂犬病疫區長期居住、工作，或至偏鄉等缺乏醫療設施之地區旅遊者，可考慮於出發前至少一個月，至國際旅遊門診自費接種3劑狂犬病疫苗，完成暴露前預防接種。
- 小心防範被狗、貓、猴子、蝙蝠等哺乳類動物抓咬傷。

二、動物「抓咬傷後」預防接種



人用狂犬病疫苗共5劑

- ① 咬傷時
第一劑注射後
- ② 第3日
- ③ 第7日
- ④ 第14日
- ⑤ 第28日

若於中國大陸遭受動物咬傷，建議至省市級以上之疾控中心、省市級之公立醫院就醫，可獲得較佳的醫療品質。



狂犬病足以讓人致命



世界衛生組織公布，全球平均約10分鐘就有1人因狂犬病死亡，95%發生於亞洲及非洲。感染狂犬病未及時治療，**致死率幾乎是100%！**


(圖片來源：美國CDC網站)

預防狂犬病，民衆注意事項：

一、動物「抓咬傷前」預防

- 前往狂犬病疫區長期居住、工作，或至偏鄉等缺乏醫療設施之地區旅遊者，可考慮於出發前至少一個月，至國際旅遊門診自費接種3劑狂犬病疫苗，完成暴露前預防接種。
- 小心防範被狗、貓、猴子、蝙蝠等哺乳類動物抓咬傷。

二、動物「抓咬傷後」預防接種



人用狂犬病疫苗共5劑

- ① 咬傷時
第一劑注射後
- ② 第3日
- ③ 第7日
- ④ 第14日
- ⑤ 第28日

若於中國大陸遭受動物咬傷，建議至省市級以上之疾控中心、省市級之公立醫院就醫，可獲得較佳的醫療品質。



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

疫情通報及諮詢專線：☎1922 <http://www.cdc.gov.tw>