

遠離愛滋、健康一生

●請張貼宣導

愛滋病的傳染途徑：

一、性行為傳染：

與愛滋病毒感染者發生口腔、肛門、陰道等方式之性交或其他體液交換時，均有受感染之可能。

二、血液傳染：

1. 輸進或接觸被愛滋病毒感染的血液、血液製劑。
2. 與感染愛滋病毒之靜脈藥癮者共用注射針頭、針筒。
3. 接受愛滋病毒感染者之器官移植。

三、母子垂直傳染：

嬰兒也會由已感染愛滋病毒的母親在妊娠期間、生產期或因授乳而感染愛滋病毒。

感染愛滋病毒會有哪些症狀：

根據台大醫院的調查，以不明原因的發燒、腹瀉、體重減輕、咳嗽、口腔念珠菌感染最為常見。

何謂空窗期？空窗期間會傳染嗎？

愛滋病毒感染後，需要經過一段時間血液才會產生愛滋病毒抗體，因此在感染後的早期，可能因抗體尚未產生，而檢驗結果是陰性反應，此即為空窗期。一般而言，**空窗期約是愛滋病毒感染6-12週內**，此期間患者體內的病毒量最高且傳染力強。

如何知道已感染愛滋病？

是否有感染愛滋病毒無法單從外觀判斷，接受「**愛滋病毒抗體篩檢**」是唯一檢測方法。想確定自己是否有無感染愛滋病，應至醫療院所抽血檢查，絕不可以利用捐血中心作愛滋病毒的檢驗。

如何遠離愛滋？

1. 拒絕性誘惑
2. 忠實性伴侶
3. 全程正確使用保險套

安全性行為

