

水災後可能引發的傳染病有哪些？



腸道傳染病
(桿菌性痢疾、傷寒、霍亂、阿米巴痢疾)
腸道傳染病主要係攝食受病人或帶菌者糞便或嘔吐物污染的水或食物而感染。得病後會出現發燒、腹瀉、嘔吐等症狀。

鉤端螺旋體病

鉤端螺旋體病是一種人畜共通疾病，但不會經由人傳染給人。動物在感染鉤端螺旋體後本身沒有明顯症狀，但會經由尿液大量排菌傳染給人。所以，提醒您颱風過後請勿赤足清理家園。得病後會出現發燒、頭痛、畏寒、小腿肚疼痛等症狀。



登革熱 (俗稱天狗熱)
登革熱是藉由病媒蚊叮咬人而傳播的急性傳染病，但不會經由人直接傳染給人。典型登革熱症狀有發燒、頭痛、骨頭關節肌肉及後眼窩痛，發燒3-4天後皮膚出現紅疹。



民眾疫情通報專線：1922 或 0800-024-582
全球資訊網：<http://www.cdc.gov.tw>

水災過後，防疫總動員



防疫3步驟



清除 → 清潔 → 消毒



衛生署疾病管制局 關心您
Center for Disease Control, DOH, Taiwan



水災所造成的生活不便、財產損失，我們感同身受。為預防災後傳染病發生，請您注意下列事項，為自己的健康把關。

如何做好水災後防疫工作

飲食衛生很重要，自我保護最可靠

- 1 飲用水一定要煮沸至少三分鐘，或喝市售包裝水。
- 2 食物請煮熟並儘早食用，隔夜食物如無冷藏請勿食用。
- 3 勿吃泡水或因停電而解凍過久的食物。
- 4 飯前、便後，請徹底洗手。



為使消毒藥品之效果完全發揮，請依照以下方法進行稀釋後使用：



消毒餐具

餐具應以煮沸消毒，不能煮沸者，以每10公升水加入40cc漂白水，浸泡三十分鐘。



消毒室內(地面、牆壁、廁所、浴室)

以每10公升水加入100cc漂白水，充分洗刷。



註：市售漂白水係指次氯酸鈉溶液之有效氯濃度5%計算。

1 清除

- 水退後，請先戴上防水手套、穿著膠鞋
- 清除垃圾及屋內積水
 - 清除戶外積水容器
 - 若地下室出現積水，請儘速抽乾保持乾燥。



2 清潔

用肥皂水徹底清洗牆壁、地板、傢俱及幼童玩耍的地方。

3 消毒

稀釋市售漂白水，對泡水的廚房器具及屋內環境進行消毒。

